Première Spécialité - Chapitre 15

C.1

① L'urne contient :

- cinq boules blanches représentant un gain de 1 €;
- deux boules rayées représentant un gain de 2 €;
- deux carrés blanc représentant un gain de 2 €;
- deux carrés rayés représentant un gain de 3 €.

La variable aléatoire $\mathcal{X}$ associant le gain pour chaque objet de l'urne donne les valeurs 1, 2 et 3. Elle admet pour loi de probabilité :

x	1	2	3
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=x)$	$\frac{5}{11}$	$\frac{4}{11}$	$\frac{2}{11}$

② L'urne contient :

- trois boules blanches représentant un gain de 1 €;
- une boule rayée représentant un gain de 2 €;
- quatre carrés blanc représentant un gain de 2 €;
- trois carrés rayés représentant un gain de 3 €.

La variable aléatoire $\mathcal{X}$ associant le gain pour chaque objet de l'urne donne les valeurs 1, 2 et 3. Elle admet pour loi de probabilité :

x	1	2	3
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=x)$	$\frac{3}{11}$	$\frac{5}{11}$	$\frac{3}{11}$

C.2

① L'urne contient un total de 9 boules. On a les probabilités suivantes :

- Il y a 3 boules possédant le numéro 1 :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=1) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

- Il y a 3 boules possédant le numéro 2 :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=2) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

- Il y a 2 boules possédant le numéro 3 :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=3) = \frac{2}{9}$$

- Il y a 1 boule possédant le numéro 4 :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=4) = \frac{1}{9}$$

On synthétise ces résultats dans le tableau ci-dessous :

k	1	2	3	4
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

② On a les probabilités suivantes :

- Il n'y a que 2 boules bleues dans l'urne possédant un numéro pair :

$$\mathcal{P}(\mathcal{Y}=2) = \frac{2}{9}$$

- Il n'y a que 2 boules non-bleues dans l'urne possédant un numéro pair :

$$\mathcal{P}(\mathcal{Y}=3) = \frac{2}{9}$$

- Ainsi, il reste 5 boules qui ne gagnent rien :

$$\mathcal{P}(\mathcal{Y}=0) = \frac{5}{9}$$

On synthétise ces résultats dans le tableau ci-dessous :

k	0	2	3
$\mathcal{P}(\mathcal{Y}=k)$	$\frac{5}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$

C.3 Le tableau ci-dessous présente les diviseurs et le nombre de diviseurs pour tous les entiers compris entre 1 et 12 :

k	diviseurs de k	Nombre de diviseurs de k
1	1	1
2	1, 2	2
3	1, 3	2
4	1, 2, 4	3
5	1, 5	2
6	1, 2, 3, 6	4
7	1, 7	2
8	1, 2, 4, 8	4
9	1, 3, 9	3
10	1, 2, 5, 10	4
11	1, 11	2
12	1, 2, 3, 4, 6, 12	6

Ainsi, la variable aléatoire $\mathcal{X}$ prend ses valeurs dans l'ensemble $\{1; 2; 3; 4; 6\}$.

Il y a :

- 1 face dont le nombre possède un diviseur ;
- 5 faces dont le nombre possède deux diviseurs ;
- 2 faces dont le nombre possède trois diviseurs ;
- 3 faces dont le nombre possède quatre diviseurs ;
- 1 face dont le nombre possède six diviseurs ;

Comme il y a équiprobabilité entre les faces du dé, on en déduit la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{X}$:

x	1	2	3	4	6
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=x)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{1}{12}$

C.4

① Pour que ce tableau présente une loi de probabilité, il faut que la somme des probabilités des événements élémentaire vaille 1. Ainsi, le nombre a vérifie l'égalité suivante :

$$0,05 + 0,12 + 0,15 + 0,23 + 0,17 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=6) = 1$$

$$0,72 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=6) = 1$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=6) = 1 - 0,72$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=6) = 0,28$$

Voici le tableau complété :

x_i	1	2	3	4	5	6
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=x_i)$	0,05	0,12	0,15	0,23	0,17	0,28

- 2) a) On a :
 $\{\mathcal{X} \leq 3\} = \{\mathcal{X}=1\} \cup \{\mathcal{X}=2\} \cup \{\mathcal{X}=3\}$
Ceci étant une réunion d'événements disjoints entre eux :
 $\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 3) = \mathcal{P}(\mathcal{X}=1) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=2) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=3)$
 $= 0,05 + 0,12 + 0,15$
 $= 0,32$

- b) On a :
 $\{\mathcal{X} > 3\} = \{\mathcal{X}=4\} \cup \{\mathcal{X}=5\} \cup \{\mathcal{X}=6\}$
On en déduit la probabilité suivante :
 $\mathcal{P}(\mathcal{X} > 3) = \mathcal{P}(\mathcal{X}=4) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=5) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=6)$
 $= 0,23 + 0,17 + 0,28$
 $= 0,68$

C.5

- 1) Ce tableau représente une loi de probabilité, car toutes ces valeurs sont des nombres appartenant à l'intervalle $[0; 1]$ et car :
 $0,15 + 0,24 + 0,35 + 0,26 = 1$

- 2) a) On a : $\{\mathcal{X} \geq 2\} = \{\mathcal{X}=2\} \cup \{\mathcal{X}=3\}$
où les événements $\{\mathcal{X}=2\}$ et $\{\mathcal{X}=3\}$ sont disjoints.
On en déduit :
 $\mathcal{P}(\mathcal{X} \geq 2) = 0,35 + 0,26 = 0,61$

- b) On a : $\{\mathcal{X} < 2\} = \{\mathcal{X}=0\} \cup \{\mathcal{X}=1\}$
où les événements $\{\mathcal{X}=0\}$ et $\{\mathcal{X}=1\}$ sont disjoints
 $\mathcal{P}(\mathcal{X} < 2) = 0,15 + 0,24 = 0,39$

- c) Les événements $\{\mathcal{X}=1\}$ et $\{\mathcal{X}=3\}$ sont disjoints :
 $\mathcal{P}(\{\mathcal{X}=1\} \cup \{\mathcal{X}=3\}) = 0,24 + 0,26 = 0,5$

C.6

- a) $\mathcal{P}(\mathcal{X} < 3) = \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=1) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=2)$
 $= 0,34 + 0,3 + 0,19 = 0,83$
- b) $\mathcal{P}(\mathcal{X} \geq 3) = \mathcal{P}(\mathcal{X}=3) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=6)$
 $= 0,15 + ,002 = 0,17$
- c) $\mathcal{P}(2 \leq \mathcal{X} < 5) = \mathcal{P}(\mathcal{X}=2) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=3)$
 $= 0,19 + 0,15 = 0,34$

C.7

On dispose d'un dé équilibré à 6 faces et on associe à chaque face un gain de la manière suivante :

- la face "6" rapporte 5 €.
- la face "1" rapporte 2 €.
- les autres faces portant un numéro pair rapportent 1 €.
- les autres faces ne rapportent rien.

On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque lancer du dé, associe le gain réalisé.

- 1) Déterminer la valeur de la probabilité $\mathcal{P}(\mathcal{X}=1)$.

$\frac{1}{6}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{4}{6}$

- 2) Déterminer la valeur de la probabilité $\mathcal{P}(\mathcal{X} > 1)$.

$\frac{1}{6}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{4}{6}$

C.8

On dispose d'un dé équilibré à 6 faces et on associe à chaque face un gain de la manière suivante :

- la face "6" rapporte 5 €.
- les faces "1" et "3" rapportent 2 €.
- les autres faces portant un numéro pair rapportent 1 €.
- la face "5" ne rapporte rien.

On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque lancer du dé, associe le gain réalisé.

- 1) Déterminer la valeur de la probabilité $\mathcal{P}(\mathcal{X}=1)$.

$\frac{1}{6}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{4}{6}$

- 2) Déterminer la valeur de la probabilité $\mathcal{P}(\mathcal{X} > 1)$.

$\frac{1}{6}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{4}{6}$

C.9

- 1) a) Par complémentarité, on a :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} > 3) = 1 - \mathcal{P}(\overline{\mathcal{X} > 3}) = 1 - \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 3)$$

$$= 1 - 0,51 = 0,49$$

- b) Par complémentarité, on a :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} \geq 4) = 1 - \mathcal{P}(\overline{\mathcal{X} \geq 4}) = 1 - \mathcal{P}(\mathcal{X} < 4) = 1 - \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 3)$$

$$= 1 - 0,51 = 0,49$$

- 2) a) L'événement $\{\mathcal{X} \leq 2\}$ admet la décomposition :

$$\{\mathcal{X} \leq 2\} = \{\mathcal{X} \leq 1\} \cup \{\mathcal{X} = 2\}$$

Les deux événements $\{\mathcal{X} \leq 1\}$ et $\{\mathcal{X} = 2\}$ étant disjoints, on a :

$$\{\mathcal{X} \leq 1\} \cap \{\mathcal{X} = 2\} = \emptyset \implies \mathcal{P}(\{\mathcal{X} \leq 1\} \cap \{\mathcal{X} = 2\}) = 0$$

La formule de la probabilité de la réunion d'événements permet d'écrire :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 2) = \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 1) + \mathcal{P}(\mathcal{X} = 2) - \mathcal{P}(\{\mathcal{X} \leq 1\} \cap \{\mathcal{X} = 2\})$$

$$0,34 = 0,275 + \mathcal{P}(\mathcal{X} = 2) - 0$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} = 2) = 0,34 - 0,275$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} = 2) = 0,065$$

- b) Par un raisonnement analogue à la question précédente, on a :

- $\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 3) = \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 2) + \mathcal{P}(\mathcal{X} = 3)$

$$0,51 = 0,34 + \mathcal{P}(\mathcal{X} = 3)$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} = 3) = 0,51 - 0,34$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} = 3) = 0,17$$

- $\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 6) = \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 5) + \mathcal{P}(\mathcal{X} = 6)$

$$1 = 0,84 + \mathcal{P}(\mathcal{X} = 6)$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} = 6) = 1 - 0,84$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} = 6) = 0,16$$

- 3) a) On utilisera la relation :

$$\{\mathcal{X} \leq 5\} = \{\mathcal{X} < 2\} \cup \{2 \leq \mathcal{X} \leq 5\}$$

où le membre de droite est la réunion de deux ensembles disjoints.

On en déduit l'égalité des probabilités :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 5) = \mathcal{P}(0 \leq \mathcal{X} < 2) + \mathcal{P}(2 \leq \mathcal{X} \leq 5)$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 5) = \mathcal{P}(0 \leq \mathcal{X} \leq 1) + \mathcal{P}(2 \leq \mathcal{X} \leq 5)$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 5) = \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 1) + \mathcal{P}(2 \leq \mathcal{X} \leq 5)$$

$$0,84 = 0,275 + \mathcal{P}(2 \leq \mathcal{X} \leq 5)$$

$$\mathcal{P}(2 \leq \mathcal{X} \leq 5) = 0,84 - 0,275$$

$$\mathcal{P}(2 \leq \mathcal{X} \leq 5) = 0,565$$

b $\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 5) = \mathcal{P}(0 \leq \mathcal{X} \leq 3) + \mathcal{P}(3 < \mathcal{X} \leq 5)$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 5) = \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 3) + \mathcal{P}(3 < \mathcal{X} \leq 5)$$

$$0,84 = 0,51 + \mathcal{P}(3 < \mathcal{X} \leq 5)$$

$$\mathcal{P}(3 < \mathcal{X} \leq 5) = 0,84 - 0,51$$

$$\mathcal{P}(3 < \mathcal{X} \leq 5) = 0,33$$

C.10 L'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ se détermine par la formule :

$$E(\mathcal{X}) = 0 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) + 1 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=1) + 2 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=2)$$

$$+ 3 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=3) + 6 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=6)$$

$$= 0 \times 0,34 + 1 \times 0,3 + 2 \times 0,19 + 3 \times 0,15 + 6 \times 0,02 = 1,25$$

C.11 L'espérance a pour valeur :

$$E(\mathcal{X}) = 0 \times 0,4 + 1 \times 0,38 + 2 \times 0,15 + 5 \times 0,05 + 10 \times 0,02$$

$$= 0 + 0,38 + 0,30 + 0,25 + 0,20$$

$$= 1,13$$

C.12 L'espérance a pour valeur :

$$E(\mathcal{X}) = \sum_{k=0}^3 k \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=k) = 0 \times 0,51 + 1 \times 0,08 + 2 \times 0,17 + 3 \times 0,24$$

$$= 0 + 0,08 + 0,34 + 0,72 = 1,14$$

C.13 La variable aléatoire $\mathcal{X}$ peut prendre les valeurs 0, 80 et 280.

On a les égalités d'événements suivants :

- $\{\mathcal{X}=0\} = A$

- $\{\mathcal{X}=80\} = \bar{A} \cap \bar{B}$

- $\{\mathcal{X}=280\} = \bar{A} \cap B$

Ainsi, on a la loi de probabilité suivante :

x	0	80	280
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=x)$	0,2	0,72	0,08

L'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ est donnée par le calcul :

$$E(\mathcal{X}) = \sum_{i=1}^3 x_i \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=x_i) = 0 \times 0,2 + 80 \times 0,72 + 280 \times 0,08$$

$$= 0 + 57,6 + 22,4 = 80$$

C.14

1 a Les valeurs associées à la variable aléatoire $\mathcal{X}$ sont 0, 1 et 10. La variable aléatoire $\mathcal{X}$ a pour loi de probabilité :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=0) = \frac{5}{16} ; \mathcal{P}(\mathcal{X}=1) = \frac{10}{16} ; \mathcal{P}(\mathcal{X}=10) = \frac{1}{16}$$

b L'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ a pour valeur :

$$E(\mathcal{X}) = 0 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) + 1 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=1) + 10 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=10)$$

$$= 0 \times \frac{5}{16} + 1 \times \frac{10}{16} + 10 \times \frac{1}{16} = 0 + \frac{10}{16} + \frac{10}{16} = \frac{20}{16} \approx 1,25$$

2 a Les valeurs associées à la variable aléatoire $\mathcal{Y}$ sont 0, 1 et 10. La variable aléatoire $\mathcal{Y}$ a pour loi de probabilité :

$$\mathcal{P}(\mathcal{Y}=0) = \frac{20}{26} ; \mathcal{P}(\mathcal{Y}=1) = \frac{3}{26} ; \mathcal{P}(\mathcal{Y}=10) = \frac{3}{26}$$

b La variable aléatoire $\mathcal{Y}$ a pour espérance :

$$E(\mathcal{Y}) = 0 \times \mathcal{P}(\mathcal{Y}=0) + 1 \times \mathcal{P}(\mathcal{Y}=1) + 10 \times \mathcal{P}(\mathcal{Y}=10)$$

$$= 0 \times \frac{20}{26} + 1 \times \frac{3}{26} + 10 \times \frac{3}{26} = 0 + \frac{3}{26} + \frac{30}{26} = \frac{33}{26}$$

$$\approx 1,269 \approx 1,27$$

3 L'espérance étant à peine plus grande lorsqu'on tire une boule de l'urne B , Paul doit choisir l'urne B .

C.15

On dispose d'un dé équilibré à 6 faces et on associe à chaque face un gain de la manière suivante :

- la face "6" rapporte 5€.
- la face "1" rapporte 2€.
- les autres faces portant un numéro pair rapportent 1€.
- les autres faces ne rapportent rien.

On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque lancer du dé, associe le gain réalisé.

Déterminer l'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.

$$\blacksquare \frac{9}{6} \quad \square \frac{10}{6} \quad \square \frac{11}{6} \quad \square \frac{12}{6}$$

C.16

On dispose d'un dé équilibré à 6 faces et on associe à chaque face un gain de la manière suivante :

- la face "6" rapporte 5€.
- les faces "1" et "3" rapportent 2€.
- les autres faces portant un numéro pair rapportent 1€.
- la face "5" ne rapporte rien.

On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque lancer du dé, associe le gain réalisé.

Déterminer l'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.

$$\square \frac{9}{6} \quad \square \frac{10}{6} \quad \blacksquare \frac{11}{6} \quad \square \frac{12}{6}$$

C.17

- Étudions les différents ensembles mis en jeu dans la définition de ce jeu :

➔ L'événement $A \cap C$ contient 3 cartes ;

➔ L'événement $\bar{A} \cap B$ contient 9 cartes ;

➔ L'événement $A \cap B$ contient 3 cartes.

- On en déduit la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{X}$:

k	0	1	2	4
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	$\frac{17}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{9}{32}$	$\frac{3}{32}$

• On a l'espérance mathématique suivante :

$$E(\mathcal{X}) = 0 \times \frac{17}{32} + 1 \times \frac{3}{32} + 2 \times \frac{9}{32} + 4 \times \frac{3}{32}$$

$$= \frac{3}{32} + \frac{18}{32} + \frac{12}{32} = \frac{33}{32}$$

C.18 On notera x le nombre de points associés à chacune des voyelles :

• Dans le sac, il y a 15 jetons au total dont 6 voyelles et 9 consonnes.

⇒ la probabilité de tirer une voyelle est $\frac{6}{15}$

⇒ la probabilité de tirer une consonne est $\frac{9}{15}$

On résume la loi de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ dans le tableau ci-dessous :

k	x	$2 \cdot x$
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	$\frac{6}{15}$	$\frac{9}{15}$

•

$$E(\mathcal{X}) = \frac{8}{5}$$

$$x \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=x) + (2 \cdot x) \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=2 \cdot x) = \frac{8}{5}$$

$$x \times \frac{6}{15} + 2x \times \frac{9}{15} = \frac{8}{5}$$

$$\frac{6 \cdot x}{15} + \frac{18 \cdot x}{15} = \frac{8}{5}$$

$$\frac{24 \cdot x}{15} = \frac{8}{5}$$

A l'aide du produit en croix :

$$24 \cdot x \times 5 = 15 \times 8$$

$$120 \cdot x = 120$$

$$x = \frac{120}{120}$$

$$x = 1$$

On en déduit que, dans cette expérience aléatoire, une voyelle rapporte 1 point et une consonne rapporte 2 points.

C.19

① $E(\mathcal{X}) = -2 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=-2) + 1 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=1) + 3 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=3)$

$$+ 5 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=5) + 8 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=8)$$

$$= -2 \times 0,3 + 1 \times 0,1 + 3 \times 0,2 + 5 \times 0,1 + 8 \times 0,3$$

$$= -0,6 + 0,1 + 0,6 + 0,5 + 2,4$$

$$= 3$$

② a) Voici le tableau complété :

k	-2	1	3	5	8
$k - E(\mathcal{X})$	-5	-2	0	2	5
$[k - E(\mathcal{X})]^2$	25	4	0	4	25
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3

b) On en déduit la valeur de la variance :

$$V(\mathcal{X}) = \mathcal{P}(\mathcal{X}=-2) \cdot [-2 - E(\mathcal{X})]^2 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=1) \cdot [1 - E(\mathcal{X})]^2$$

$$+ \mathcal{P}(\mathcal{X}=3) \cdot [3 - E(\mathcal{X})]^2 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=5) \cdot [5 - E(\mathcal{X})]^2$$

$$+ \mathcal{P}(\mathcal{X}=8) \cdot [8 - E(\mathcal{X})]^2$$

$$= 25 \times 0,3 + 4 \times 0,1 + 0 \times 0,2 + 4 \times 0,1 + 25 \times 0,3$$

$$= 7,5 + 0,4 + 0 + 0,4 + 7,5 = 15,8$$

C.20

① La somme des gains de cette tombola est égale à :

$$2 \times 50 + 10 \times 20 + 20 \times 10 = 100 + 200 + 200 = 500 \text{ €}$$

② Voici la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{X}$:

k	0	10	20	50
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	$\frac{68}{100}$	$\frac{20}{100}$	$\frac{10}{100}$	$\frac{2}{100}$

③ a) On calcule l'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ par la formule :

$$E(\mathcal{X}) = 0 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) + 10 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=10) + 20 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=20) + 50 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=50)$$

$$= 0 \times \frac{68}{100} + 10 \times \frac{20}{100} + 20 \times \frac{10}{100} + 50 \times \frac{2}{100}$$

$$= 0 + 2 + 2 + 1 = 5$$

b) On calcule la variance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ à travers la formule :

$$V(\mathcal{X}) = \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) \cdot [0 - E(\mathcal{X})]^2 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=10) \cdot [10 - E(\mathcal{X})]^2$$

$$+ \mathcal{P}(\mathcal{X}=20) \cdot [20 - E(\mathcal{X})]^2 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=50) \cdot [50 - E(\mathcal{X})]^2$$

$$= \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) \cdot (0 - 5)^2 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=10) \cdot (10 - 5)^2$$

$$+ \mathcal{P}(\mathcal{X}=20) \cdot (20 - 5)^2 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=50) \cdot (50 - 5)^2$$

$$= \frac{68}{100} \times (-5)^2 + \frac{20}{100} \times 5^2 + \frac{10}{100} \times 15^2 + \frac{2}{100} \times 45^2$$

$$= 85$$

On en déduit l'écart-type : $\sigma(\mathcal{X}) \approx 9,2195$

$$\approx 9,2$$

C.21

① a) La somme des gains mis en jeu dans cette tombola a pour valeur :

$$2 \times 100 + 15 \times 10 = 200 + 150 = 350 \text{ €}$$

b) 100 tickets d'une valeur de 10 € sont mis en vente, rapportant ainsi une vente de :

$$100 \times 10 = 1000 \text{ €}$$

Le bénéfice réalisé par les organisateurs de la tombola est de :

$$1000 - 350 = 650 \text{ €}$$

② Voici la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{X}$:

k	0	10	100
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	$\frac{83}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{2}{100}$

③ a) Les gains possibles lors de la tombola sont 0, 10 et 100 :

$$E(\mathcal{X}) = 0 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) + 10 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=10) + 100 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=100)$$

$$= 0 \times \frac{83}{100} + 10 \times \frac{15}{100} + 100 \times \frac{2}{100}$$

$$= 0 + 1,5 + 2 = 3,5 \text{ €}$$

b) Par définition de la variance d'une variable aléatoire, on a :

$$\begin{aligned}
 V(\mathcal{X}) &= \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) \cdot [0 - E(\mathcal{X})]^2 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=10) \cdot [10 - E(\mathcal{X})]^2 \\
 &\quad + \mathcal{P}(\mathcal{X}=100) \cdot [100 - E(\mathcal{X})]^2 \\
 &= \frac{83}{100} \cdot (0 - 3,5)^2 + \frac{15}{100} \cdot (10 - 3,5)^2 + \frac{2}{100} \cdot (100 - 3,5)^2 \\
 &= \frac{83}{100} \cdot (-3,5)^2 + \frac{15}{100} \times 6,5^2 + \frac{2}{100} \times 96,5^2 \\
 &= 202,75
 \end{aligned}$$

On en déduit l'écart-type de la variable aléatoire $\mathcal{X}$:
 $\sigma(\mathcal{X}) = \sqrt{V} \approx 14,239 \approx 14,24$

C.22

1 On a l'arbre de probabilité suivante :

Sur la colonne de droite est représentée le prix payé dans chaque cas présenté par cet arbre de choix.

2 a D'après l'arbre de probabilité, on a :

$$\mathcal{P}(S_p \cap \bar{R}) = 0,6 \times 0,7 = 0,42$$

b Les événements S_p , $S_n \cap \bar{R}$ et $S_r \cap \bar{R}$ sont disjoints entre eux. On a l'égalité suivante :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}(S_p \cup \bar{R}) &= \mathcal{P}(S_p) + \mathcal{P}(S_n \cap \bar{R}) + \mathcal{P}(S_r \cap \bar{R}) \\
 &= 0,6 + 0,2 \times 0,7 + 0,2 \times 0,7 \\
 &= 0,6 + 0,14 + 0,14 = 0,88
 \end{aligned}$$

3 a D'après l'arbre de probabilité présenté à la question 1, la variable aléatoire $\mathcal{X}$ prend 4 valeurs distinctes : 15 ; 20 ; 30 ; 35

On a les probabilités suivantes :

$$\bullet \mathcal{P}(\mathcal{X}=15) = \mathcal{P}(S_r \cap \bar{R}) = 0,2 \times 0,7 = 0,14$$

$$\bullet \mathcal{P}(\mathcal{X}=20) = \mathcal{P}(S_p \cap \bar{R}) + \mathcal{P}(S_n \cap \bar{R}) = 0,6 \times 0,7 + 0,2 \times 0,7 = 0,42 + 0,14 = 0,56$$

$$\bullet \mathcal{P}(\mathcal{X}=30) = \mathcal{P}(S_r \cap R) = 0,2 \times 0,3 = 0,06$$

$$\bullet \mathcal{P}(\mathcal{X}=35) = \mathcal{P}(S_p \cap R) + \mathcal{P}(S_n \cap R) = 0,6 \times 0,3 + 0,2 \times 0,3 = 0,18 + 0,06 = 0,24$$

En résumé, on obtient le tableau ci-dessous représentant la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{X}$:

k	15	20	30	35
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	0,14	0,56	0,06	0,24

b La variable aléatoire $\mathcal{X}$ a pour espérance :

$$\begin{aligned}
 E(\mathcal{X}) &= 15\mathcal{P}(\mathcal{X}=15) + 20\mathcal{P}(\mathcal{X}=20) + 30\mathcal{P}(\mathcal{X}=30) + 35\mathcal{P}(\mathcal{X}=35) \\
 &= 15 \times 0,14 + 20 \times 0,56 + 30 \times 0,06 + 35 \times 0,24 \\
 &= 2,1 + 11,2 + 1,8 + 8,4 = 23,5
 \end{aligned}$$

C.23

1 Cette expérience aléatoire donne l'arbre pondéré ci-dessous :

2 a La variable aléatoire $\mathcal{X}$ peut prendre les valeurs 0, 1 et 2.

Pour dresser la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{X}$, on complète l'arbre de probabilité avec :

- la valeur associée par la variable aléatoire $\mathcal{X}$ à chacune des branches de l'arbre ;
- la probabilité de chacune des branches.

La loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ est présentée dans le tableau ci-dessous :

k	0	1	2
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	$\frac{25}{64}$	$\frac{30}{64}$	$\frac{9}{64}$

b L'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ a pour valeur :

$$E(\mathcal{X}) = 0 \times \frac{25}{64} + 1 \times \frac{30}{64} + 2 \times \frac{9}{64} = \frac{30}{64} + \frac{18}{64} = \frac{48}{64} = \frac{3}{4}$$

C.24

1 Voici l'arbre de probabilité complété :

On a mis sur la droite les prix relatifs à la question 3.

La colonne de droite présente le montant de la facture en fonction des choix du client : cette colonne sera utilisée lors de la question 3.

2 On a la probabilité suivante :

$$\mathcal{P}(\bar{C} \cap F) = 0,1 \times 0,3 = 0,03$$

3 a La variable aléatoire $\mathcal{X}$ prend les valeurs suivantes : 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7

b La variable aléatoire admet le tableau suivant pour loi de probabilité :

k	3	4	5	6	7
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	0,02	0,03	0,23	0,27	0,45

- c) La variable aléatoire $\mathcal{X}$ a pour espérance :
 $E(\mathcal{X}) = 0,02 \times 3 + 0,03 \times 4 + 0,23 \times 5 + 0,27 \times 6 + 0,45 \times 7$
 $= 0,06 + 0,12 + 1,15 + 1,62 + 3,15 = 6,1$

C.25

- 1) Voici l'arbre complété :

- 2) a) On a la relation :
 $\mathcal{P}(B \cap \bar{D}) = \mathcal{P}(B) \times \mathcal{P}_B(\bar{D}) = 0,2 \times 0,8 = 0,16$
 b) Les événements A et B forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a la relation :
 $\mathcal{P}(\bar{B}) = \mathcal{P}(A \cap \bar{D}) + \mathcal{P}(B \cap \bar{D})$
 $= \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}_A(\bar{D}) + \mathcal{P}(B) \times \mathcal{P}_B(\bar{D})$
 $= 0,8 \times 0,9 + 0,2 \times 0,8 = 0,72 + 0,16 = 0,88$

- c) Par définition d'une probabilité conditionnelle, on a :
 $\mathcal{P}_D(A) = \frac{\mathcal{P}(A \cap D)}{\mathcal{P}(D)} = \frac{\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}_A(D)}{\mathcal{P}(D)}$
 $= \frac{0,8 \times 0,1}{1 - 0,88} \approx 0,66666 \approx 0,667$

- 3) a) On a les probabilités suivantes :
 • $\mathcal{P}(\mathcal{X}=250) = \mathcal{P}(A \cap \bar{D}) = 0,8 \times 0,9 = 0,72$
 • $\mathcal{P}(\mathcal{X}=300) = \mathcal{P}(A \cap D) + \mathcal{P}(B \cap \bar{D})$
 $= 0,8 \times 0,1 + 0,2 \times 0,8 = 0,08 + 0,16 = 0,24$
 • $\mathcal{P}(\mathcal{X}=350) = \mathcal{P}(B \cap D) = 0,2 \times 0,2 = 0,04$
 La loi de probabilité de $\mathcal{X}$ est donnée dans le tableau ci-dessous :

k	250	300	350
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	0,72	0,24	,04

- 4) L'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ a pour valeur :
 $E(\mathcal{X}) = 250 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=250) + 300 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=300) + 350 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=350)$
 $= 250 \times 0,72 + 300 \times 0,24 + 350 \times 0,04$
 $= 180 + 72 + 14 = 266$

C.26

- 1)
- 2) a) On recherche la probabilité de l'événement $M \cap T$; en utilisant l'arbre de probabilité, on obtient :

$$\mathcal{P}(M \cap T) = \mathcal{P}(M) \cdot \mathcal{P}_M(T)$$

$$= 0,01 \times 0,85 = 0,0085$$

On a la décomposition suivante de l'événement T :

$$T = (M \cap T) \cup (\bar{M} \cap T).$$

Les deux éléments de cette réunion sont disjoints entre eux ; d'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\mathcal{P}(T) = \mathcal{P}(M \cap T) + \mathcal{P}(\bar{M} \cap T)$$

$$= \mathcal{P}(M) \cdot \mathcal{P}_M(T) + \mathcal{P}(\bar{M}) \cdot \mathcal{P}_{\bar{M}}(T)$$

$$= 0,01 \times 0,85 + 0,99 \times 0,05$$

$$= 0,058$$

- 3) On recherche la probabilité $\mathcal{P}_T(M)$:

D'après la définition des probabilités conditionnelles, on a :

$$\mathcal{P}_T(M) = \frac{\mathcal{P}(M \cap T)}{\mathcal{P}(T)}$$

D'après les résultats de la question 2) :

$$= \frac{0,0085}{0,058} \approx 0,147$$

- 4) a) Notons que $\mathcal{X}$ la variable aléatoire associant à un animal le coût à engager ; son espérance a pour valeur :
 $E(\mathcal{X}) = 0 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) + 100 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=100) + 1000 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=1000)$
 $= 0 \times 0,9405 + 100 \times 0,0580 + 1000 \times 0,0015 = 7,3$

- b) L'espérance présente montre qu'en moyenne l'éleveur dépensera 7,3€ par bête ; ainsi, pour 200 bêtes, il pourra espérer dépenser :
 $200 \times 7,3 = 1460 \text{ €}.$

C.27

- 1) a) Voici l'arbre complété :

- b) D'après la définition des probabilités conditionnelles, on a :

$$\bullet \quad \mathcal{P}_M(O) = \frac{\mathcal{P}(M \cap O)}{\mathcal{P}(M)}$$

$$0,006 = \frac{\mathcal{P}(M \cap O)}{0,74}$$

$$\mathcal{P}(M \cap O) = 0,006 \times 0,74$$

$$\mathcal{P}(M \cap O) = 0,00444$$

$$\bullet \quad \mathcal{P}_K(O) = \frac{\mathcal{P}(K \cap O)}{\mathcal{P}(K)}$$

$$0,086 = \frac{\mathcal{P}(K \cap O)}{0,26}$$

$$\mathcal{P}(K \cap O) = 0,086 \times 0,26$$

$$\mathcal{P}(K \cap O) = 0,02236$$

L'étude portant sur les médecins et les kinésithérapeutes, les événements M et K forment une partition de l'univers d'étude.

D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\mathcal{P}(O) = \mathcal{P}(O \cap M) + \mathcal{P}(O \cap K)$$

$$= 0,00444 + 0,02236 = 0,0268$$

- c) La probabilité demandée est "Sachant que le praticien

pratique l'ostéopathie, quelle est la probabilité que ce soit un kinésithérapeute": c'est la probabilité conditionnelle $\mathcal{P}_O(K)$.

Par la définition des probabilités conditionnelles, on a :

$$\mathcal{P}_O(K) = \frac{\mathcal{P}(O \cap K)}{\mathcal{P}(O)} = \frac{0,02236}{0,0268} \approx 0,8343 \approx 0,83$$

- 2 a) Voici l'arbre de probabilité avec indiqué à droite le prix des consultations pour chaque événement :

On en déduit les probabilités associées à la variable aléatoire $\mathcal{X}$:

- $\mathcal{P}(\mathcal{X}=30) = \mathcal{P}(K \cap \bar{O}) = 0,23764$
- $\mathcal{P}(\mathcal{X}=35) = \mathcal{P}(M \cap \bar{O}) + \mathcal{P}(K \cap O) = 0,73556 + 0,02236 = 0,75792$
- $\mathcal{P}(\mathcal{X}=40) = \mathcal{P}(M \cap O) = 0,00444$

k	30	35	40
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	0,23764	0,75792	0,00444

- b) On en déduit l'espérance :

$$E(\mathcal{X}) = 30 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=30) + 35 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=35) + 40 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=40) = 33,834$$

C.28

- 1) Voici les différentes probabilités de choisir une urne plutôt qu'une autre :

$$\mathcal{P}(U_1) = \frac{1}{6} ; \quad \mathcal{P}(U_2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} ; \quad \mathcal{P}(U_3) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

- 2 a) Dans l'urne U_1 , il y a deux boules noires sur cinq boules au total; ainsi, la probabilité de tirer une noire sachant qu'on est en train de tirer une boule dans l'urne U_1 est de :

$$\mathcal{P}_{U_1}(N) = \frac{2}{5}$$

- b) L'urne U_2 contient trois boules noires sur un total de cinq boules; ainsi, la probabilité de tirer une boule noire dans l'urne U_2 est de :

$$\mathcal{P}_{U_2}(N) = \frac{3}{5}$$

- c) Pour les mêmes raisons, on a :

$$\mathcal{P}_{U_3}(N) = \frac{3}{5}$$

- 3) Ainsi, on a l'arbre de probabilité conditionnelle suivant :

- 4) Les événements U_1, U_2, U_3 sont disjoints entre eux et forment à eux trois l'ensemble des possibilités, on a d'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(N) &= \mathcal{P}(U_1 \cap N) + \mathcal{P}(U_2 \cap N) + \mathcal{P}(U_3 \cap N) \\ &= \frac{1}{15} + \frac{3}{10} + \frac{1}{5} = \frac{2}{30} + \frac{9}{30} + \frac{6}{30} = \frac{17}{30} \end{aligned}$$

- 5) On considère la variable $\mathcal{X}$ aléatoire qui associe à la boule tirée le gain obtenu. On a :

- $\{\mathcal{X}=5\} = N$; on en déduit : $\mathcal{P}(\mathcal{X}=5) = \mathcal{P}(N) = \frac{17}{30}$

- $\{\mathcal{X}=0\} = R$; on en déduit : $\mathcal{P}(\mathcal{X}=0) = \mathcal{P}(R) = \frac{13}{30}$

Cette variable aléatoire a pour espérance :

$$E(\mathcal{X}) = 5 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=5) + 0 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) = 5 \times \frac{17}{30} \approx 2,8$$

C.29

- 1

- 2) L'arbre de probabilité conditionnelle nous permet d'obtenir rapidement les probabilités suivantes :

- $\mathcal{P}(\bar{E}_1 \cap E_2) = \mathcal{P}(\bar{E}_1) \times \mathcal{P}_{\bar{E}_1}(E_2) = \frac{7}{8} \times \frac{9}{20} = \frac{63}{160}$

- $\mathcal{P}(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_2) = \mathcal{P}(\bar{E}_1) \times \mathcal{P}_{\bar{E}_1}(\bar{E}_2) = \frac{7}{8} \times \frac{11}{20} = \frac{77}{160}$

- $\mathcal{P}(E_1 \cap E_2) = \mathcal{P}(E_1) \times \mathcal{P}_{E_1}(E_2) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{20} = \frac{1}{160}$

- $\mathcal{P}(E_1 \cap \bar{E}_2) = \mathcal{P}(E_1) \times \mathcal{P}_{E_1}(\bar{E}_2) = \frac{1}{8} \times \frac{19}{20} = \frac{19}{160}$

La variable aléatoire peut prendre les trois valeurs 0, 1, 2; on a :

- $\{\mathcal{X}=0\} = E_1 \cap E_2 \implies \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) = \frac{1}{160}$

- $\{\mathcal{X}=1\} = (E_1 \cap \bar{E}_2) \cup (\bar{E}_1 \cap E_2) \implies \mathcal{P}(\mathcal{X}=1) = \frac{19}{160} + \frac{63}{160} = \frac{82}{160} = \frac{41}{80}$

- $\{\mathcal{X}=2\} = \bar{E}_1 \cap \bar{E}_2 \implies \mathcal{P}(\mathcal{X}=2) = \frac{77}{160}$